

Tabelle I.

Datum	Eingeführte U	Urinmenge (aufgefüllt)	Ausge- schiedene \bar{U}	Bemerkungen
4. V.	—	500 ccm	—	Grünfütter Murexidprobe und Silberfällung negativ
5. V.	—			
6. V.	0,4 g U in Piperazin gelöst intravenös	500 ccm	0,116 g	Mikroskopisch: U-Sphärolithe
7. V.	0,4 g U in Piperazin gelöst intravenös			
8. V.	—	400 ccm	0,013 g	—
9. V.	—			
14. V.	0,4 g U in Piperazin gelöst subkutan	250 ccm	0,115 g	—
15. V.	0,4 g U in Piperazin gelöst subkutan			
16. V.	—	300 ccm	0,002 g	—
17. V.	—			
18. V.	—	300 ccm	—	Murexidprobe und Silberfällung negativ
19. V.	—			
20. V.	0,4 g U in Piperazin gelöst mit der Schlundsonde per os	400 ccm	0,005 g	—
21. V.	0,4 g U in Piperazin gelöst per os			
22. V.	—	250 ccm	—	Murexidprobe und Silberfällung negativ
23. V.	—			

Versuch II.

Kräftiges, gesundes Kaninchen, weiblich, 2990 g schwer.

Tabelle II.

Datum	Eingeführte U	Urinmenge (aufgefüllt)	Ausge- schiedene \bar{U}	Bemerkungen
8. VI.	0,5 g U in Piperazin gelöst (20 ccm) intravenös	300 ccm	0,044 g	Grünfütter
9. VI.	—			
10. VI.	0,5 g U in Piperazin gelöst (20 ccm) subkutan	325 ccm	0,022 g	.
11. VI.	—			
13. VI.	0,5 g U in Piperazin gelöst (20 ccm) mit Schlundsonde per os	350 ccm	Keine \bar{U} nachweisbar	.
14. VI.	—			